







Grundwissen 10. Klasse

Wissen/ Können	Beispiele																
<p>1. Zusammengesetzte Zufallsexperimente: Die bedingte Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A unter der Bedingung B:</p> $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}; P(B) \neq 0$ <p>$A \cap B$: Die Schnittmenge von A und B beinhaltet nur die Ergebnisse, die sowohl in A als auch in B liegen.</p> <p>Vierfeldertafel:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>\bar{A}</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>$P(A \cap B)$</td> <td>$P(\bar{A} \cap B)$</td> <td>$P(B)$</td> </tr> <tr> <td>\bar{B}</td> <td>$P(A \cap \bar{B})$</td> <td>$P(\bar{A} \cap \bar{B})$</td> <td>$P(\bar{B})$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>$P(A)$</td> <td>$P(\bar{A})$</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Baumdiagramm:</p> 		A	\bar{A}		B	$P(A \cap B)$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(B)$	\bar{B}	$P(A \cap \bar{B})$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{B})$		$P(A)$	$P(\bar{A})$	1	<p>Beispiel: Urne mit 3 schwarzen Kugeln mit den Zahlen 1,2,3 und 2 weißen Kugeln mit den Zahlen 4,5</p> <p>A: „Die gezogene Kugel ist weiß.“ B: „Die Zahl auf der gezogenen Kugel ist gerade.“ $A \cap B$: „Die gezogene Kugel ist weiß und trägt eine gerade Zahl.“</p> <p>$P(A \cap B) = \frac{1}{5}$</p> <p>Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel weiß ist, wenn ich schon weiß, dass ihre Zahl gerade ist?</p> $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{2}$ <p>Merke: Bei der bedingten Wahrscheinlichkeit habe ich schon Vorinformationen, d.h. eine Vorauswahl, aus der heraus ich das Experiment starte.</p>
	A	\bar{A}															
B	$P(A \cap B)$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(B)$														
\bar{B}	$P(A \cap \bar{B})$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{B})$														
	$P(A)$	$P(\bar{A})$	1														
<p>2. Berechnungen an Kreis und Kugel:</p> <p>Kreis mit Radius r:</p> <p>Sektorfläche: $A_s = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot r^2 \pi$</p> <p>Länge des Kreisbogens: $b = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2r\pi$</p> <p>Bogenmaß ($\alpha_{RAD}$): Zum jeweiligen Winkel im Gradmaß (α_{DEG}) gehörende Bogenlänge auf dem Einheitskreis: $\frac{\alpha_{RAD}}{\alpha_{DEG}} = \frac{2\pi}{360^\circ}$</p> <p>Kugel mit Radius r:</p> <p>Volumen: $V_{Kugel} = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$;</p> <p>Oberflächeninhalt: $O_{Kugel} = 4\pi \cdot r^2$</p>	<p>➤ Gesucht: Flächeninhalt und Umfang der Figur</p>  $\left[A = a^2 \left(\frac{19}{12} \pi - \sqrt{3} \right), u = \frac{7}{3} a \pi \right]$ <p>➤ Gegeben ist eine Kugel mit einem Durchmesser von 51,0 cm.</p> $r = \frac{d}{2} = 25,5 \text{ cm}$ $V_{Kugel} = \frac{4}{3} \pi \cdot (25,5 \text{ cm})^3 \approx 69,5 \text{ dm}^3$ $O_{Kugel} = 4\pi \cdot (25,5 \text{ cm})^2 \approx 81,7 \text{ dm}^2$																
<p>3. Logarithmus und einfache Exponentialgl.:</p> <p>Der Logarithmus von b zur Basis a ist diejenige Zahl, mit der man a potenzieren muss, um b zu erhalten:</p> <p>$\log_a b$ mit: $a, b \in \mathbb{R}^+$ und $a \neq 1$</p> <p>Dies ist die Lösung der Gleichung: $a^x = b$.</p> <p>Taschenrechner geben u.a. die Werte des Zehnerlogarithmus $\log_{10} b = \lg b$ aus: $\log_a b = \frac{\lg b}{\lg a}$</p> <p>Rechenregeln für Logarithmen ($b, c > 0$):</p> <p>(1) $\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$; (2) $\log_a (b : c) = \log_a b - \log_a c$ (3) $\log_a (b^c) = c \cdot \log_a b$</p> <p>Einfache Exponentialgleichungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zusammenfassen zu: $a^x = b$, dann log anwenden. 2) Auf beiden Seiten logarithmieren und Rechenregeln für Logarithmus anwenden, um direkt nach x aufzulösen. 3) Umformen, so dass auf beiden Seiten Potenz mit gleicher Basis ist => Exponentenvergleich 4) Näherung, falls nicht anders lösbar. 	<p>➤ $3^x = 81 \Rightarrow x = \log_3 81 = \frac{\lg 81}{\lg 3} = 4$</p> <p>➤ $7 \cdot 2^{4x} - 3 \cdot 5^{x+2} = 0$ $7 \cdot (2^4)^x = 3 \cdot (5^x \cdot 5^2)$ $7 \cdot 16^x = 75 \cdot 5^x$ $\left(\frac{16}{5}\right)^x = \frac{75}{7}$ $x = \log_{\frac{16}{5}} \frac{75}{7} \approx 2,04$</p> <p>➤ $2^x \cdot 3^{x+1} = 7 \cdot 5^{2x} \quad \lg(\dots)$ $\lg(2^x) + \lg(3^{x+1}) = \lg 7 + \lg(5^{2x})$ $x \cdot \lg 2 + (x+1) \cdot \lg 3 = \lg 7 + 2x \cdot \lg 5 \quad -\lg 3 - 2x \lg 5$ $x \cdot (\lg 2 + \lg 3 - 2 \lg 5) = \lg 7 - \lg 3$ $x = \frac{\lg 7 - \lg 3}{\lg 2 + \lg 3 - 2 \lg 5} \approx -0,594$</p> <p>➤ $2^{3x+2} = 4^x \Leftrightarrow 2^{3x+2} = 2^{2x} \Rightarrow \text{Exp.vgl.} : 3x + 2 = 2x$ $\Leftrightarrow x = -2$</p>																

4. Spezielle Funktionen:



	Sinusfunktion	Kosinusfunktion	Exponentialfunktion	Potenzfunktion
Term	$\sin(x)$	$\cos(x)$	a^x mit $0 < a$	x^n mit $n \in \mathbb{N}$
Graph				
Max. Def., Wertemenge	$D = \mathbb{R}$, $W = [-1; 1]$ -> Amplitude: $A = 1$	$D = \mathbb{R}$, $W = [-1; 1]$ -> Amplitude: $A = 1$	$D = \mathbb{R}$, $W = \mathbb{R}^+$	$D = \mathbb{R}$, n gerade: $W = \mathbb{R}^+$ n ungerade: $W = \mathbb{R}$
Nullstellen	$k \cdot \pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{2k+1}{2} \pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$	keine	$x = 0$, n-fache NS
Symmetrie	achsen- und punktsymmetrisch, v.a. Pktsymm. zum Ursprung	achsen- und punktsymm., v.a. Achsensymm. zur y-Achse	Weder achsen- noch punktsymmetrisch	n gerade: achsensymm. n ungerade: punktsymm.
Grenzwerte	Keine	keine	Für $a > 1$: $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$ n gerade: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \infty$ n unger.: $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$
Steigungs- verhalten	Steigend zwischen Min und Max, fallend zwischen Max und Min	Steigend zwischen Min und Max, fallend zwischen Max und Min	Für $a > 1$: steigend Für $0 < a < 1$: fallend	n gerade: fallend ($x < 0$), steigend ($x > 0$) n ungerade: steigend
Extrempunkte	Minima bzw. Maxima: bei $x = \frac{2k+1}{2} \pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$, y- Wert -1 bzw 1	Minima bzw. Maxima: bei x $= k \cdot \pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$, y-Wert -1 bzw 1	keine	n gerade: Scheitel (0/0) n ungerade: keine
Besonder- heiten	Periode 2π	Periode 2π	(0/1) auf dem Graphen	(1/1) auf jedem Graphen, (-1/1) n gerade bzw. (-1/-1) n ungerade

5. Eigenschaften von Funktionen:

- Maximale Definitionsmenge** (Nenner nie Null, Radikant nicht negativ), **Wertemenge**
- Nullstellen:** $f(x) = 0$, Art der NS; **Schnittpunkt mit y-Achse:** $f(0)$
- Symmetrieverhalten des Graphen:**
Punktsymm. zum Ursprung: $f(-x) = -f(x)$
Achsensymm. zur y-Achse: $f(-x) = f(x)$
- Verhalten der Funktionswerte für beliebig große/kleine x-Werte (Grenzwerte):** v.a.
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ ($n \in \mathbb{N}$) ; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} c = c$

6. Parameter verändern Funktionsgraphen:

Veränderungen im Funktionsterm	Auswirkungen auf Graphen
$g(x) = f(x) + b$	Verschiebung um b in y-Richtung
$g(x) = a \cdot f(x)$ ($a \neq 0$)	Streckung (Stauchung) mit dem Faktor a in y-Richtung. Für $a < 0$ zusätzlich Spiegelung an der x-Achse.
Spezialfall: $g(x) = -f(x)$	Spiegelung an der x-Achse
$g(x) = f(x+d)$	Verschiebung um $-d$ in x-Richtung
$g(x) = f(c \cdot x)$ ($a \neq 0$)	Streckung (Stauchung) mit dem Faktor $\frac{1}{c}$ in x-Richtung. Für $c < 0$ bedeutet das zusätzlich eine Spiegelung an der y-Achse.
Spezialfall: $g(x) = f(-x)$	Spiegelung an der y-Achse

	Ganzrationale Funktion	Einfache gebrochen-rationale Fkt.
f	$x \mapsto 2x^5 - 4x^4 + 2x^3 - 4x^2$ $= 2x^2 \cdot (x-2) \cdot (x^2+1)$	$x \mapsto \frac{-x^2+9}{x^2-1} = \frac{-(x+3) \cdot (x-3)}{(x+1) \cdot (x-1)}$
G_f		
(1)	$D = \mathbb{R}$, $W = \mathbb{R}$	$D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$, $W = \mathbb{R} \setminus \{9; -1\}$
(2)	$x_1=0$ (doppelt) $x_2=2$ (einfach)	NS des Zählers: $x_1=-3$; $x_2=3$ (beide einfach)
(3)	keine	Achsensymm. zur y-Achse: $f(-x) = \frac{-(-x)^2+9}{(-x)^2-1} = \frac{-x^2+9}{x^2-1} = f(x)$
(4)	$\lim_{x \rightarrow \infty} [2x^5 - 4x^4 + 2x^3 - 4x^2] =$ $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x^5 \cdot \left(2 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{4}{x^3} \right) \right] = \infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} [2x^5 - 4x^4 + 2x^3 - 4x^2] = -\infty$	z.B.: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^2+9}{x^2-1} =$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 \cdot \left(-1 + \frac{9}{x^2} \right)}{x^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{x^2} \right)} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-1 + \frac{9}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} \right) = -1$